



### الأسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة

#### الجاري

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة ٢٤ ساعة وإلى أن تجف جميع القرح وتقشر. خلال تقشّي جاري الماء، لن يسمح للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجري الماء (فاريسيللا) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعلوبي بالتوارد في المدرسة لمدة ٢١ يوماً بعد تعرّضهم لجري الماء، حتى لو لم يكونوا مرضى.

#### الإسهال

إبقاء الطفل المنزلي في حال كون البراز طرياً أو سائلًا في غضون ٢٤ ساعة، حتى لو لم يكن هناك أي علامات أخرى من المرض الرجاء إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال أعراض الإسهال.

#### الحمى:

الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصعد إلى ١٠٠,٥ درجة فهرنهايت أو أكثر. إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة واستمرار زوالها مدة ٢٤ ساعة دون استعمال أي أدوية خاضعة للحرارة مثل الموتزن أو تايلنول.

#### أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا

ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور القشعريرة، الآم في العضلات، من الممن أيضًا الإصابة بالإسهال والتقيّي. يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال العوارض السابقة دون تناول أي دواء.

#### قمل الرأس

إذا تم اكتشاف القمل للمرة الأولى في المدرسة سوف يسمح للطفل بإكمال اليوم الدراسي لنهائيته يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين إتمام المعالجة و زوال جميع الحشرات الحية

#### الحصف (داء جلدي)

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب. جب تغطية الأفاس أثناء وجوده في المدرسة.

#### عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمُشَيَّلين

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القرح ملتئفة ومتقحة ولا يمكن تغطيتها بلاصقة طبية نظيفة وجافة. يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم يكن بمقدوره التوقف عن حك الفروح

#### الطفح الجلدي

يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب وتلقّي العلاج إذا لزم الأمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة

#### التهاب الحلق

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على بدء الأدوية المضادة للالتهاب.

#### التهاب باطن العين

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء

#### القوباء الحلقيّة مرض جلدي

إبقاء الطفل في المنزل حتى يراه الطبيب وحتى يبدأ العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة في المدرسة حتى تلتئم تماماً.

#### الجرب

يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العلاج.

#### الآقياء

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا ما تفقي مرتبين أو أكثر خلال ال ٢٤ ساعة يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة عليه دون إقباء.

#### آلام معوية

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بألم في البطن يستمر لأكثر من ساعتين أو ألم متقطع مع حمى أو أعراض أخرى.